

ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

EPREUVES ESC

CONCOURS D'ADMISSION SUR CLASSES PREPARATOIRES

MATHEMATIQUES
OPTION SCIENTIFIQUE

MARDI 18 MAI 2004 , de 8 h à 12 h

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. Les candidats sont invités à encadrer, dans la mesure du possible, les résultats de leurs calculs. Ils ne doivent faire usage d'aucun document ;

**"L'usage de toute calculatrice ou de tout matériel électronique
est interdit pendant cette épreuve".**

Seule l'utilisation d'une règle graduée est autorisée.

L'épreuve est composée de trois exercices indépendants.

N.B. Il est demandé au candidat d'indiquer, **impérativement**, son numéro d'inscription sur les copies.

EXERCICE 1

On munit $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique. On donne les matrices suivantes :

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -2 & 2 \\ -2 & 1 & -4 \\ 2 & -4 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \end{bmatrix} \quad V_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad V_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

O désigne la matrice colonne nulle d'ordre 3.

I désigne la matrice identité (matrice unité) d'ordre 3.

Lorsque λ est une valeur propre d'une matrice carrée C , on notera $E_C(\lambda)$ le sous-espace propre associé.

Soit l'application ϕ de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie pour toute matrice M de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ par $\phi(M) = BM - MA$.

1. (a) Montrer que les valeurs propres de A sont -3 et 6 . Déterminer $E_A(-3)$ et $E_A(6)$.
- (b) Montrer que 0 est valeur propre de B et déterminer $E_B(0)$. Montrer que $E_B(0) \subset E_A(-3)$.
- (c) Montrer que 3 est valeur propre de B et déterminer $E_B(3)$. Montrer que $E_B(3) \subset E_A(-3)$.
- (d) Montrer que (V_1, V_2) est une base orthogonale de $E_A(-3)$ formée de vecteurs propres de B .
En déduire une matrice colonne d'ordre 3 notée V_3 et de première coordonnée égale à 1 telle que (V_1, V_2, V_3) soit une base orthogonale de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ formée de vecteurs propres de A .
- (e) Exprimer BV_3 en fonction de V_2 et V_3 .

En déduire que la matrice B est semblable à la matrice $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

2. (a) Montrer que ϕ est un endomorphisme de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
 - (b) Soit H une matrice carrée d'ordre 3 élément de $\text{Ker}(\phi)$.
Montrer que $(B + 3I)HV_1 = O$, $(B + 3I)HV_2 = O$ et $(B - 6I)HV_3 = O$.
En déduire $HV_1 = O$, $HV_2 = O$ et $HV_3 = O$ et que ϕ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.
3. Soient a et b deux valeurs propres respectives de A et de B .
Soit X un vecteur propre de A associé à a et Y un vecteur propre de B associé à b .
Montrer que $Y {}^tX$ est non nulle et calculer $\phi(Y {}^tX)$. En déduire que $b - a$ est valeur propre de ϕ .
4. Soit λ une valeur propre de ϕ . Soit M une matrice carrée vecteur propre de ϕ associée à la valeur propre λ .
- (a) Montrer que :
 $(B - (\lambda - 3)I)MV_1 = O$, $(B - (\lambda - 3)I)MV_2 = O$ et $(B - (\lambda + 6)I)MV_3 = O$.
 - (b) Montrer que :
si $MV_1 \neq O$ alors $\lambda - 3$ est valeur propre de B .
si $MV_2 \neq O$ alors $\lambda - 3$ est valeur propre de B .
si $MV_3 \neq O$ alors $\lambda + 6$ est valeur propre de B .
 - (c) Montrer que MV_1, MV_2, MV_3 ne peuvent pas être tous nuls.
En déduire que λ est la différence d'une valeur propre de B et d'une valeur propre de A .
Donner finalement l'ensemble des valeurs propres de ϕ .

EXERCICE 2

Lorsque A et B sont deux événements d'un même espace probabilisé, on désignera par $P_B(A)$ la probabilité conditionnelle de A sachant B , où B est un événement de probabilité non nulle : $P_B(A) = P(A/B)$.

On considère un réel strictement positif α et la fonction f_α définie sur \mathbb{R} par :

Pour tout $t \in]0;1]$, $f_\alpha(t) = \alpha t^{(\alpha-1)}$ et pour tout $t \in]-\infty;0] \cup]1;+\infty[$, $f_\alpha(t) = 0$.

1. (a) Montrer que f_α est une densité de probabilité. Soit X_α une variable aléatoire de densité f_α .
- (b) Déterminer la fonction de répartition de la variable X_α .
- (c) Montrer que pour tous réels a et b tels que $0 < a \leq b \leq 1$, $P_{X_\alpha \leq b}(X_\alpha \leq a) = P(X_\alpha \leq \frac{a}{b})$.
(C'est-à-dire $P(X_\alpha \leq a / X_\alpha \leq b) = P(X_\alpha \leq \frac{a}{b})$).

2. Ce paragraphe étudie une fonction H vérifiant la propriété **(R)** :

(R) : H est dérivable sur $]0;1]$ et pour tous réels x et y de $]0;1]$, $H(xy) = H(x)H(y)$.

- (a) Montrer que pour tout réel t de $]0;1]$, $(H(\sqrt{t}))^2 = H(t)$. En déduire le signe de H sur $]0;1]$.
- (b) On suppose ici qu'il existe un réel β de $]0;1]$ tel que $H(\beta) = 0$.

Montrer grâce au 2(a) et par récurrence que pour tout entier naturel n , $H(\beta^{\frac{1}{2^n}}) = 0$.

En déduire par continuité de H que $H(1) = 0$, puis, que H est nulle sur $]0;1]$.

- (c) On suppose ici que pour tout réel β de $]0;1]$, $H(\beta) \neq 0$.

c1. Montrer que H est strictement positive sur $]0;1]$. Montrer que $H(1) = 1$.

c2. Montrer que pour tous réels x et y de $]0;1]$, $yH'(xy) = H'(x)H(y)$.

c3. On considère la fonction V dérivable sur $]0;1]$ définie par :

Pour tout réel $t \in]0;1]$, $V(t) = \ln(H(t))$.

Montrer que pour tout réel $t \in]0;1]$, $V'(t) = \frac{H'(1)}{t}$.

c4. Montrer que pour tout réel $t \in]0;1]$, $V(t) = H'(1) \ln(t)$.

En déduire que pour tout réel $t \in]0;1]$, $H(t) = t^{H'(1)}$.

3. On suppose dans ce paragraphe que Y est une variable à densité vérifiant les propriétés suivantes :

- $Y(\Omega) =]0;1]$.
- La fonction de répartition F_Y de Y est dérivable sur $]0;1]$.
- Pour tous réels a et b tels que $0 < a \leq b \leq 1$, $P_{Y \leq b}(Y \leq a) = P(Y \leq \frac{a}{b})$.

(a) Montrer que F_Y vérifie la propriété **(R)**.

(b) En déduire qu'il existe un réel strictement positif α tel que Y et X_α suivent la même loi.

EXERCICE 3

On considère la fonction f définie sur \mathbb{N} par :
$$\begin{cases} f(k) = 0 & \text{si } k \text{ est pair (ceci comprend } k = 0) \\ f(k) = 1 & \text{si } k \text{ est impair} \end{cases}$$

On considère un entier naturel non nul N , et on définit les suites $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ de la manière suivante :

$$\begin{cases} N_0 = N ; u_0 = f(N_0) \\ \text{Pour tout } k \in \mathbb{N}, N_{k+1} = \frac{N_k - u_k}{2} \text{ et } u_{k+1} = f(N_{k+1}) \end{cases}$$

1. Deux exemples.

- Déterminer les suites $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ lorsque $N = 27$.
- Déterminer les suites $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ lorsque $N = 2^{10}$.

2. Dans cette question on étudie les suites $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ dans le cas général.

- Montrer par récurrence que pour tout entier naturel k :
 u_k existe et appartient à $\{0, 1\}$ et N_k existe et appartient à \mathbb{N} .
- Montrer que pour tout entier naturel k , $N_{k+1} \leq \frac{1}{2} N_k$.
En déduire que la suite $(N_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est de limite nulle.
Montrer qu'il existe un rang n_0 à partir duquel N_k est inférieur à $\frac{1}{2}$.
En déduire que pour tout entier naturel k supérieur ou égal à n_0 , $N_k = u_k = 0$.
- Montrer que pour tout entier naturel k , $2^{k+1} N_{k+1} - 2^k N_k = -2^k u_k$.
En déduire en sommant de $k=0$ à n_0 que : $N = 2^0 u_0 + 2^1 u_1 + \dots + 2^{n_0} u_{n_0}$.
- Montrer que la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ne peut pas être la suite identiquement nulle.

Il existe donc un entier s inférieur à n_0 tel que $u_s = 1$ et pour tout k strictement supérieur à s , $u_k = 0$.

3. Informatique. On dispose de la fonction Turbo-Pascal définie de la manière suivante :

```
function g ( n : integer ) : integer ;
begin
  g := n - 2 * int ( n / 2 ) ;
end;
```

où **int** (x) représente la fonction mathématique "partie entière de x ", aussi notée $[x]$.

(On rappelle que $[x]$ est l'unique entier tel que $[x] \leq x < [x] + 1$).

- En distinguant deux cas selon que n est pair ou impair, montrer que la fonction g n'est autre que la fonction f .
- Soit d l'entier égal à la partie entière de $\frac{\ln(N)}{\ln(2)}$.
Montrer que d est l'unique entier tel que $2^d \leq N < 2^{d+1}$.
En déduire que l'entier s évoqué dans le 2.(d) est égal à d .
- Ecrire finalement un programme utilisant la fonction g qui demande un entier naturel non nul N , calcule d et affiche successivement les valeurs u_0, u_1, \dots, u_d .